

# Ariane FGS

## Ukrudtsbekæmpelse

Til bekæmpelse af ukrudt i frøgræs og græsmarker én gang om året



Mængde Varenr.  
5 liter 50212

### Varebeskrivelse

Ariane FGS er et systemisk ukrudtsmiddel til bekæmpelse af tokimbladet ukrudt i frøgræs og græsmarker. Ariane FGS bekæmper bl.a. burresnerre, forglemmigej, hvidmelet gåsefod, kamille, fuglegræs, fersken-, vej- og snerlepileurt, korsblomstret ukrudt, hyrdetaske, hanekro, haremad, liden nælde, lægejordrøg, natlimurt, pengeurt, svinemælde, valmue og tidsel.

Ariane FGS optages primært gennem bladene og består af auxindannerne fluroxypyr, clopyralid og MCPA.

På følsomme ukrudtsarter ses effekt 1-2 dage efter behandling. Den fulde effekt ses fra 3 uger efter behandling. Optimal effekt opnås om morgenen, når planterne er saftspændte og i god vækst. Dagstemperaturen bør være over 12 °C, når der behandles. Undgå at behandle hvis der i perioden omkring sprøjtetidspunktet er udsigt til frost. Undgå at sprøjte når afgrøden er stresset på grund af kulde, tørke, vandlidende jord, angrebet af skadedyr, næringsstofmangel og meget høje dagtemperaturer.

### Anvendelse

BBCH 21-31		Effekt	
Første års mark	Anden og flerårs marker	> 90% effekt	70-90% effekt
2,5 liter /ha	3,0 liter /ha	Korsblomstret ukrudt, hyrdetaske, hvidmelet gåsefod, markforglemmeje, agersennep og storkenæb.	
2,5 liter /ha	3,5 liter /ha	Som ovenfor + burresnerre, kamille (lugtløs og vellugtende), fuglegræs, fersken-, vej- og snerlepileurt, hanekro, haremad, liden nælde, lægejordrøg, natlimurt, pengeurt, svinemælde og valmue.	Agerstedmoder, gul okseøje, spergel, tidsler, tvetand, ærenpris.

Vejledende blandingsforhold: pr. 100 m<sup>2</sup>: 25-35 ml til 3-10 liter vand. (blandingsforholdet varierer alt efter ukrudtstype - se præcis blandingsforhold på dunken).

### Yderligere info

Tåler ikke frost.

Linie Kemi